

Флударабін ХС548 (європейський протокол) НХЛ хронічна

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-5	Флударабіну фосфат	25	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Флударабіну фосфат																												

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

Примітка:

Увага! Синдром розпаду пухлини та порушення функції Т-лімфоцитів.

Флударабіну фосфат також можна вводити підшкірно (40 мг/м² д1-5 та на 29 добу).

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

The French Cooperative Group on CLL, *Lancet* 347: 1432ff, 1996; Rossi J.F. et al., *J Clin Oncol* 22: 1260ff, 2004.

