

# Ритуксимаб ХА090 (європейський протокол) НХЛ хронічна

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500 мл	5 годин (3 години)	внутрішньовенно

## Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8
Ритуксимаб							

## Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
8 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
4

### Примітка:

Ритуксимаб: Початкова швидкість інфузій - 50 мг/год; через 30 хвилин її можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Подальші дози вводяться на початковій швидкості 100 мг/год та збільшуються на 100 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Рекомендується премедикація - 30 мг Дифенгідраміну.

Всього рекомендується 4 цикли.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Maloney D. et al., Blood 90: 2188ff, 1997.

