ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Ритуксимаб XA090 (європейський протокол) НХЛ хронічна

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500 мл	5 годин (3 години)	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8
Ритуксимаб							

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
8 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
4

Примітка:
Ритуксимаб: Початкова швидкість інфузій - 50 мг/год; через 30 хвилин її можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Подальші дози вводяться на початковій швидкості 100 мг/год та збільшуються на 100 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Рекомендується премедикація - 30 мг Дифенгідраміну.
Всього рекомендується 4 цикли.
Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).
Остання зміна змісту: січень 2016 р.
Література:

Maloney D. et al., Blood 90: 2188ff, 1997.