

## **FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) ХС532 (FEC); ХС416 (Доцетаксел) (європейський протокол) - Частина 2 Рак молочної залози**

<b>Дні терапії</b>	<b>Лікарський засіб</b>	<b>Дозування, мг/м<sup>2</sup></b>	<b>Розчинник</b>	<b>Об'єм (мл / шт)</b>	<b>Час введення</b>	<b>Шлях введення</b>
1	Доцетаксел	100		250 мл	1 година	внутрішньовенно

### **Графік введення препаратів:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Доцетаксел</b>																					

### **Додаткова інформація**

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
3**

#### **Примітка:**

**Увага! Дана схема дійсна і застосовується після схеми - FEC / Доцетаксел (режим PACS 01) ХС532 (FEC); ХС416 (Доцетаксел) (європейський протокол) - Частина 1.**

**Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.**

**Супутня медикація:**

**Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 діб, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.**

**Література:**

**Roche H. et al., J Clin Oncol 24: 5664ff, 2006.**

