

## Флударабін / Циклофосфамід / Ритуксимаб ХС552 + ХА090 (європейський протокол) НХЛ хронічна

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Ритуксимаб	500*	0,9% NaCl	500 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1-3	Флударабін	25	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1-3	Циклофосфамід	250	0,9% NaCl	500 мл	5 годин (3 години)	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Ритуксимаб</b>																												
<b>Флударабін</b>																												
<b>Циклофосфамід</b>																												

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
2

#### Примітка:

(\*) Ритуксимаб: Початкова швидкість інфузій - 50 мг/год; через 30 хвилин її можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Подальші дози вводяться на початковій швидкості 100 мг/год та збільшуються на 100 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Рекомендується премедикація - 30 мг Дифенгідраміну.

Увага! Синдром розпаду пухлини та порушення функції Т-лімфоцитів.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Hallek M. et al., Lancet 376: 1164ff, 2010.

