ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Флударабін / Циклофосфамід / Ритуксимаб XC552 + XA090 (європейський протокол) НХЛ хронічна

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Ритуксимаб	500*	0,9% NaCl	500 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1-3	Флударабін	25	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1-3	Циклофосфамід	250	0,9% NaCl	500 мл	5 годин (3 години)	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Ритуксимаб	■																												
Флударабін	■	■	■																										
Циклофосфамід	■	■	■																										

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

Примітка:
(*) Ритуксимаб: Початкова швидкість інфузій - 50 мг/год; через 30 хвилин її можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Подальші дози вводяться на початковій швидкості 100 мг/год та збільшуються на 100 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Рекомендується премедикація - 30 мг Дифенгідраміну.
Увага! Синдром розпаду пухлини та порушення функції Т-лімфоцитів.
Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).
Остання зміна змісту: січень 2016 р.
Література:
Hallek M. et al., Lancet 376: 1164ff, 2010.