

Гемцитабін / Цисплатин ХС592 (доба 1), ХС592 (доба 8) (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
5,10	Вінбластин	6	5% Глюкоза	0	-	перорально
1,8	Гемцитабін	750	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
3,10	Метотрексат	30	5% Глюкоза	0	-	внутрішньовенно
1	Флюороурацил	400	5% Глюкоза	200 мл	30	перорально
1,8	Цисплатин	30	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Вінбластин																					
Гемцитабін																					
Метотрексат																					
Флюороурацил																					
Цисплатин																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO₄ внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Література:

Nagourney RA et al., J Clin Oncol 18: 2245ff, 2000.

