

FOLFIRINOX XC588 (європейський протокол) Рак підшлункової залози та холангіоцелюлярна карцинома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1,15	Іринотекан	180	0,9% NaCl	500 мл	90 минут	внутрішньовенно
1,15	Кальцію фолінат	400	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутрішньовенно
1,15	Оксаліплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутрішньовенно
1,15	Флюороурацил	400	-	0	Болюс	внутрішньовенно
1,15	Флюороурацил	2400	0,9% NaCl	500 мл	46 часов	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Іринотекан																												
Кальцію фолінат																												
Оксаліплатин																												
Флюороурацил																												
Флюороурацил																												

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Увага! Іринотекан може викликати небезпечну для життя діарею та холінергічний синдром. Діарея може виникнути або в гострій формі або в деякі дні після введення Іринотекану.

Супутня медикація: Атропін 0,2 мг підшкірно або внутрішньовенно. У разі діареї: Лоперамід, спочатку 4 мг, потім по 2 мг кожні 2 години. Прийом Лоперамиду слід продовжувати ще протягом 12 годин після припинення діареї. Якщо вона триває більш ніж 48 годин або у разі лихоманки, рекомендується призначення Ципрофлоксацину та госпіталізація.

(*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU. 5FU можна вводити за допомогою інфузійного насоса амбулаторно.

Література:

Conroy T. et al., N Engl J Med 364: 1817ff, 2011.