ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Хлорамбуцил / Обінутузумаб XA076 (європейський протокол) НХЛ хронічна

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15	Обінутузумаб	1000 мг (const)	0,9% NaCl	500 мл	-	внутрішньовенно
1, 15	Хлорамбуцил	0,5 мг/кг	-	0	**	перорально

Графік введення препаратів:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Обінутузумаб																													
Хлорамбуцил																													

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

Примітка:
(*) Обінутузумаб лише в 1-шу добу, починаючи з 2 циклу і далі.
(**) Обінутузумаб, 1-й цикл.
Доба 1: 100 мг; введення зі швидкістю 25 мг/год протягом 4 год.
Доба 2: 900 мг; введення зі швидкістю 50 мг/год; швидкість інфузії можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год.
Доба 8, 15: Ведення інфузії розпочинається зі швидкістю 100 мг/год та збільшується на 100 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год.
Рекомендується премедикація - 30 мг Дифенгідраміну.
Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler
(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).
Остання зміна змісту: січень 2016 р.
Література:
Goede V. et al., N Engl J Med 370: 1011ff, 2014.