

HD 5FU (змінюється відповідно до режиму Ardan) XA149 (європейський протокол) Колоректальний рак

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|------------------|------------------|------------------------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 10 | Вінкрестин | 1(*) | 5% Глюкоза | 0 | - | внутрішньовенно |
| 1 | Вінорельбін | 25 | 5% Глюкоза | 0 | - | внутрішньовенно |
| 3 | Доцетаксел | 36 | 5% Глюкоза | 0 | - | внутрішньовенно |
| 1,8,15,22, 29,36 | Кальцію фолінат | 500 | 0,9% NaCl | 250 мл | 2 часа | внутрішньовенно |
| 1,8,15,22, 29,36 | Флюороурацил | 2600 | 0,9% NaCl | 1000 мл | 22 часа | внутрішньовенно |
| 1,7 | Циклофосфамід | 250 | 0,9% NaCl | 0 | - | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Вінкрестин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вінорельбін | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доцетаксел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кальцію фолінат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Флюороурацил | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Циклофосфамід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
50 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Кількість циклів: У разі гарної переносимості продовжувати протягом всього перебігу захворювання.

(*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

Література:

Weh H.J. et al., Ann Oncol 5: 233ff, 1994.

