

HD 5FU (змінюється відповідно до режиму Ardan) XA149 (європейський протокол) Колоректальний рак

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
10	Вінкрестин	1(*)	5% Глюкоза	0	-	внутрішньовенно
1	Вінорельбін	25	5% Глюкоза	0	-	внутрішньовенно
3	Доцетаксел	36	5% Глюкоза	0	-	внутрішньовенно
1,8,15,22, 29,36	Кальцію фолінат	500	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутрішньовенно
1,8,15,22, 29,36	Флюороурацил	2600	0,9% NaCl	1000 мл	22 часа	внутрішньовенно
1,7	Циклофосфамід	250	0,9% NaCl	0	-	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Вінкрестин																															
Вінорельбін																															
Доцетаксел																															
Кальцію фолінат																															
Флюороурацил																															
Циклофосфамід																															

Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:
50 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6**

Примітка:

Кількість циклів: У разі гарної переносимості продовжувати протягом всього перебігу захворювання.

(*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

Література:

Weh H.J. et al., Ann Oncol 5: 233ff, 1994.

