хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

5FU / Лейковорин / Оксаліплатин (FOLFOX IV) + Бевацизумаб XC588 + XA060 (європейський протокол) Колоректальний рак

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
4	Доцетаксел	36	5% Глюкоза	0	-	болюс
1,2,15,16	Кальцію фолінат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 години	внутрішньовенно
5	Паклітаксел	80	5% Глюкоза	0	-	внутрішньовенно
1,2,15,16	Флюороурацил	400	-	0	Болюс	внутрішньовенно
1,2,15,16	Флюороурацил	600	0,9% NaCl	500 мл	22 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Доцетаксел				■																									
Кальцію фолінат	■	■													■	■													
Паклітаксел					■																								
Флюороурацил	■	■													■	■													
Флюороурацил	■	■													■	■													

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:
(*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.
(*) Бевацизумаб: Початкову дозу вводять протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості першої інфузії, другу інфузію вводять протягом 60 хв. У разі гарної переносимості 60-хвилинної інфузії, всі наступні інфузії можна вводити протягом 30 хвилин.
Література:
Saltz et al., J Clin Oncol 26: 2013ff, 2008.