

Доцетаксел (щотижня) ХС412 (європейський протокол) Рак молочної залози

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15, 22, 29, 36	Доцетаксел	36	0,9% NaCl	100 мл	1 час	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Доцетаксел																																

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
50 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
4

Примітка:

Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.

Ризик виникнення мукозиту знижують шляхом скорочення циклу (доба 1, 8, 15; повторно - на 29 добу).

Супутня медикація: Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 діб, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.

У разі відсутності реакції гіперчутливості, дозу Дексаметазону можна знизити до 2х 4 орально в день прийому Доцетакселу.

Література:

Hainsworth J.D. et al., J Clin Oncol 19: 3500ff, 2001.

