

Цисплатин / Ралтитрексид ХС812 (європейський протокол) Мезотеліома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
6	Вінкристин	1(*)	5% Глюкоза	0	-	внутрішньовенно
5	Доцетаксел	36	5% Глюкоза	0	-	внутрішньовенно
5	Флюороурацил	400	5% Глюкоза	0	-	внутрішньовенно
1	Цисплатин	80	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Вінкристин																					
Доцетаксел																					
Флюороурацил																					
Цисплатин																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO₄ внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Література:

Van Meerbeeck J.P. et al., J Clin Oncol 23: 688ff, 2005.