

5FU / Лейковорин / Оксаліплатин (FOLFOX IV) + Бевацизумаб ХС588 + ХА060 (європейський протокол) Колоректальний рак

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1,15	Бевацизумаб	5 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 минут	внутрішньовенно
1,2,15,16	Кальцію фолінат	200	0,9% NaCl	250 мл	2 часа	внутрішньовенно
1,15	Оксаліплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутрішньовенно
1,2,15,16	Флюороурацил	600	0,9% NaCl	500 мл	22 часа	внутрішньовенно
1,2,15,16	Флюороурацил	400	-	0	Болус	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Бевацизумаб																												
Кальцію фолінат																												
Оксаліплатин																												
Флюороурацил																												
Флюороурацил																												

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

(*) Кальцій фолінат як модулятор 5FU застосовується до 5FU.

(*) Бевацизумаб: Початкову дозу вводять протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості першої інфузії, другу інфузію вводять протягом 60 хв. У разі гарної переносимості 60-хвилинної інфузії, всі наступні інфузії можна вводити протягом 30 хвилин.

Література:

Saltz et al., J Clin Oncol 26: 2013ff, 2008.