

Ібрутиніб ХА149 (європейський протокол) НХЛ хронічна

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-30	Ібрутиніб	420 (const)	-	0	-	перорально

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ібрутиніб																														
[Графік показує постійний прийом препарату протягом 31 днів]																														

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
31 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
постійний прийом

Повторно: * Постійний прийом.

Примітка:

Для лікування лімфоми з клітин мантийної зони рекомендована доза - 560 мг/д.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016.

Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Byrd J.C. et al., N Engl J Med 371: 213ff, 2014;

Wang M.L. et al., N Engl J Med 369: 507ff, 2013.

