

# EVANS CAV XC032 (європейський протокол) - Частина 1

## Дрібноклітинний рак легень - ДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Вінкристин	1,4(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутрішньовенно
1	Доксорубіцин	50	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	1000	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
<b>Вінкристин</b>																																	
<b>Доксорубіцин</b>																																	
<b>Циклофосфамід</b>																																	

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
**43 (день)**

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
**3**

Увага - схема лікування повинна проводиться тільки з - EVANS CAV XC032 (європейський протокол) - Частина 2.

Повторно: Доба 22 (почергово).

Кількість циклів: 6 (3x CAV та 3x почергово Цисплатин/Етопозид).

Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ  $\geq 60$  мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Увага! Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній дозі  $\geq 500$  мг/м<sup>2</sup>.

(\*) Вінкристин, макс. кількість доз - 2 мг.

Месна: 20% дози Циклофосфаміду внутрішньовенно або орально через 0, 4, 8 годин після прийому Циклофосфаміду. Належний діурез.

Якщо загальна доза становить  $\geq 200$  мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% NaCl.

Література:

Evans W.K. et al., Ann Int Med 107: 451ff, 1987.

