

Вінорелбін (перорально) ХА149 (європейський протокол) - Частина 2 Недрібноклітинний рак легень - НДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Вінорельбін	80	-	0	-	перорально
1	Метотрексат	30	5% Глюкоза	0	-	перорально

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8
Вінорельбін							
Метотрексат							

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
8 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
1

Примітка:

Призначення цієї схеми можливо тільки після проходження схеми - Вінорелбін (перорально) ХА149 (європейський протокол) - Частина 1.

У разі нейтропенії (один раз при 4 ступені за ВООЗ або два рази при ступені 3 за ВООЗ):

- Протягом перших трьох тижнів після початку лікування зберігати дозу 60 мг/м²/тиждень.
- (*) Протягом наступних тижнів знижувати дозу з 80 мг/м²/тиждень до 60 мг/м²/тиждень.

Література:

Jassem J. et al., Ann Oncol 12: 1375ff, 2001.

