


## Цисплатин / Вінорелбін / Цетуксимаб ХС336 (дoba 1) + ХА070; ХС884 (дoba 8) + ХА070; ХА070 (дoba 15) (європейський протокол) Недрібноклітинний рак легень - НДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1,8	Вінорельбін	25	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутрішньовенно
1	Метотрексат	30	5% Глюкоза	0	-	перорально
1,8,15	Цетуксимаб	250	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутрішньовенно
1	Цисплатин	80	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:



### Додаткова інформація

#### Примітка:

Вінорелбін вводиться швидко внутрішньовенно.

(Увага! Тромбофлебіт; загроза некрозу після екстравазації, тому бажане застосування катетера "Port-A-Cath").

Після чого 250 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно.

Цисплатин (лише якщо ШКФ  $\geq 60$  мл/хв):

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

(\*) Цетуксимаб: Перше введення - протягом 120 хвилин у дозі 400 мг/м<sup>2</sup> до початку хіміотерапії. Відповідно до протоколу досліджень, прийом Цетуксимабу продовжується після завершення хіміотерапії протягом перебігу захворювання або настання неприпустимої токсичності.

#### Література:

Pirker R. et al., Lancet 373: 1525ff, 2009.

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6**

