

## Іделалісиб / Ритуксимаб ХА149 + ХА090 (європейський протокол) НХЛ хронічна

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1-14	Іделалізиб	300 мг (const)	-	0	-	перорально
1	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500 мл	5 годин (3 години)	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Іделалізиб</b>														
<b>Ритуксимаб</b>														

### Додаткова інформація

Повторно: \* Постійний прийом.

\*\* Ритуксимаб кожні 2 тижні по 4 дози, а далі - кожні 4 тижні по 3 дози - всього 8 інфузій.

Примітка:

(\*\*) Ритуксимаб 500 мг/м<sup>2</sup> з 2 циклу і далі.

Ритуксимаб: Початкова швидкість інфузій - 50 мг/год; через 30 хвилин її можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Подальші дози вводяться на початковій швидкості 100 мг/год та збільшуються на 100 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Рекомендується премедикація - 30 мг Дифенгідраміну.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#)

(керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Furman R.R. et al., N Engl J Med 370: 997ff, 2014.

ПОВТОРНО НА:  
15 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
8

