

**Цисплатин / Вінорелбін / Цетуксимаб ХС336 (доба 1) + ХА070; ХС884 (доба 8) + ХА070; ХА070 (доба 15) (європейський протокол) Недрібноклітинний рак легень - НДРЛ**

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1,8	Вінорельбін	25	0,9% NaCl	100	10 минут	внутрішньовенно
1,8,15	Цетуксимаб	250	0,9% NaCl	500	1 час	внутрішньовенно
1	Цисплатин	80	0,9% NaCl	1000	2 часа	внутрішньовенно

**Графік введення препаратів:**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Вінорельбін</b>																					
■							■														
<b>Цетуксимаб</b>																					
■							■							■							
<b>Цисплатин</b>																					
■																					

**Додаткова інформація**

**ПОВТОРНО НА:  
22 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6**

**Примітка:**

**Вінорелбін вводиться швидко внутрішньовенно.**

**(Увага! Тромбофлебіт; загроза некрозу після екстравазації, тому бажане застосування катетера "Port-A-Cath").**

**Після чого 250 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно.**

**Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥60 мл/хв):**

**Супутня медикація:**

**Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв КСІ + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.**

**200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.**

**Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв КСІ.**

**(\*) Цетуксимаб: Перше введення - протягом 120 хвилин у дозі 400 мг/м<sup>2</sup> до початку хіміотерапії. Відповідно до протоколу досліджень, прийом Цетуксимабу продовжується після завершення хіміотерапії протягом перебігу захворювання або настання неприпустимої токсичності.**

**Література:**

**Pirker R. et al., Lancet 373: 1525ff, 2009.**

