

Цисплатин / Вінорелбін / Цетуксимаб ХС336 (доба 1) + ХА070; ХС884 (доба 8) + ХА070; ХА070 (доба 15) (європейський протокол) Недрібноклітинний рак легень - НДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1,8	Вінорельбін	25	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутрішньовенно
1,8,15	Цетуксимаб	250	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутрішньовенно
1	Цисплатин	80	0,9% NaCl	1000 мл	2 часа	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Вінорельбін																					
█							█														
Цетуксимаб																					
█							█							█							
Цисплатин																					
█																					

Додаткова інформація

Примітка:

Вінорелбін вводиться швидко внутрішньовенно.

(Увага! Тромбофлебіт; загроза некрозу після екстравазації, тому бажане застосування катетера "Port-A-Cath").

Після чого 250 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно.

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO₄ внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

(*) Цетуксимаб: Перше введення - протягом 120 хвилин у дозі 400 мг/м² до початку хіміотерапії. Відповідно до протоколу досліджень, прийом Цетуксимабу продовжується після завершення хіміотерапії протягом перебігу захворювання або настання неприпустимої токсичності.

Література:

Pirker R. et al., Lancet 373: 1525ff, 2009.

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

