

Бортезоміб / Ритуксимаб - Циклофосфамід / Доксорубіцин / Преднізон ХА020 + ХА090 (європейський протокол) НХЛ хронічна

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 4, 8, 11	Бортезоміб	1,3	-	0	-	підшкірно
1	Доксорубіцин	50	0,9% NaCl	500 мл	5 годин (3 години)	внутрішньовенно
1-5	Преднізон	100	-	0	1 годину	перорально
1	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500 мл	1 годину	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	750	0,9% NaCl	500 мл	-	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Бортезоміб																					
█			█				█			█											
Доксорубіцин																					
█																					
Преднізон																					
█	█	█	█	█																	
Ритуксимаб																					
█																					
Циклофосфамід																					
█																					

Додаткова інформація

Кількість циклів: 6-8.

Примітка:

Ритуксимаб: Початкова швидкість інфузій - 50 мг/год; через 30 хвилин її можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Подальші дози вводяться на початковій швидкості 100 мг/год та збільшуються на 100 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год.

Рекомендується премедикація - 30 мг Дифенгідраміну.

Увага! Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній кількості доз ≥ 500 мг/м².

Месна: 20% дози Циклофосфаміду, через 0, 4, 8 год. після прийому Циклофосфаміду (перорально або внутрішньовенно).

Концентрація Бортезомібу - 2,5 мг/мл.

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Robark T. et al., N Engl J Med 372: 944ff, 2015.

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

