

## Бортезоміб / Ритуксимаб - Циклофосфамід / Доксорубіцин / Преднізон ХА020 + ХА090 (європейський протокол) НХЛ хронічна

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1, 4, 8, 11	Бортезоміб	1,3	-	0	-	підшкірно
1	Доксорубіцин	50	0,9% NaCl	500	5 годин (3 години)	внутрішньовенно
1-5	Преднізон	100	-	0	1 годину	перорально
1	Ритуксимаб	375	0,9% NaCl	500	1 годину	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	750	0,9% NaCl	500	-	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Бортезоміб</b>																					
█			█				█			█											
<b>Доксорубіцин</b>																					
█																					
<b>Преднізон</b>																					
█	█	█	█	█																	
<b>Ритуксимаб</b>																					
█																					
<b>Циклофосфамід</b>																					
█																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

Кількість циклів: 6-8.

Примітка:

**Ритуксимаб:** Початкова швидкість інфузій - 50 мг/год; через 30 хвилин її можна збільшувати на 50 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Подальші дози вводяться на початковій швидкості 100 мг/год та збільшуються на 100 мг/год кожні 30 хвилин, максимально до 400 мг/год. Рекомендується премедикація - 30 мг Дифенгідраміну. Увага! Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній кількості доз  $\geq 500$  мг/м<sup>2</sup>.

**Месна:** 20% дози Циклофосфаміду, через 0, 4, 8 год. після прийому Циклофосфаміду (перорально або внутрішньовенно).

Концентрація Бортезомібу - 2,5 мг/мл.

Література:

Robark T. et al., N Engl J Med 372: 944ff, 2015.