ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

CEOP-IMVP16-DEXA XC236 (добу 1-5); XC240 (добу 15-19); XC244 (доба 22) (європейський протокол) НХЛ гостра

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1,8	Вінкристин	1,4(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 минут	внутрішньовенно
15-19	Дексаметазон	40	-	0	-	перорально
15-17	Іфосфамід	2000	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутрішньовенно
22	Метотрексат	800	0,9% NaCl	1000 мл	4 часа	внутрішньовенно
1-5	Преднізон	100 (const)	-	0	-	перорально
1	Циклофосфамід	750	0,9% NaCl	500 мл	1 час	внутрішньовенно
1	Епірубіцин	70	0,9% NaCl	250 мл	30 минут	внутрішньовенно
15-17	Етопозид	100	0,9% NaCl	500 мл	2 часа	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:



Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
8

Примітка:
Месна: 150 мг/м² у 500 мл 0,9% розчину NaCl протягом 30 хвилин одразу до прийому Циклофосфаміду, потім 750 мг/м² протягом 12 год. (починаючи з прийому Циклофосфаміду).
(*) Вінкристин, макс. 2 мг.
Увага! Епірубіцин може бути кардіотоксичним при загальній дозі ≥1000 мг/м².
Кальцій фолінат: 15 мг/м² перорально кожні 6 год. на 23-25 добу.
Якщо загальна доза становить ≥200 мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% NaCl.
Література:
Fridrik MA., J Clin Oncol 14: 227ff, 1996.