ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

ABVD XC024 (європейський протокол) Ходжкінська лімфома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 15	Блеоміцин	10	-	0	болюс	внутрішньовенно
1, 15	Вінбластин	6	0,9% NaCl	100 мл	1 годину	внутрішньовенно
1, 15	Дакарбазин	375	0,9% NaCl	500 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
1, 15	Доксорубіцин	25	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Блеоміцин																													
	■														■														
Вінбластин																													
	■														■														
Дакарбазин																													
	■														■														
Доксорубіцин																													
	■														■														

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

Примітка:
Увага! Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній кількості доз ≥500 мг/м.
Дакарбазин: обов'язкова інфузійна система у світлонепроникних контейнерах.
Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).
Остання зміна змісту: січень 2016 р.
Література:

Santoro A. et al., Cancer Chemother Pharmacol 2: 101ff, 1979.