

ІМVP-16 ХС656 (європейський протокол) НХЛ гостра

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1-5 | Іфосфамід | 1000 | 0,9% NaCl | 500 мл | 1 час | внутрішньовенно |
| 3,10 | Метотрексат | 30 | 0,9% NaCl | 100 мл | 15 минут | внутрішньовенно |
| 1-3 | Етопозид | 100 | 0,9% NaCl | 500 мл | 2 часа | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Іфосфамід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| █ | █ | █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Метотрексат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | █ | | | | | | | █ | | | | | | | | | | | | |
| Етопозид | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| █ | █ | █ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

Примітка:

Якщо загальна доза становить ≥ 200 мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% розчину NaCl. Месна: 200 мг/м² у 500 мл 0,9% розчину NaCl протягом 30 хвилин одразу до прийому Іфосфаміду, потім 1000 мг/м² протягом 12 год. (починаючи з прийому Іфосфаміду).

Література:

Cabanillas F. et al., Blood 60: 693ff, 1982.

