

## Нінтеданіб / Доцетаксел ХС412 (європейський протокол) Недрібноклітинний рак легень - НДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Доцетаксел	75	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно
2,21	Нінтеданіб	400 мг (const)	-	0	-	перорально

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Доцетаксел</b>																					
<b>Нінтеданіб</b>																					

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.

Супутня медикація: Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 діб, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.

Нінтеданіб призначають по 200 мг два рази на добу.

Пацієнти, у яких була припинена комбінована терапія у зв'язку з небажаними явищами, викликаними доцетакселом.

#### Література:

Reck M. et al., Lancet Oncol 15: 143ff, 2014.

