хемотека
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

BEACOPP (інтенсивна) XC148 (доба 1-3); XC152 (доба 8) (європейський протокол) Ходжкінська лімфома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
8	Блеоміцин	10	-	0	болюс	внутрішньовенно
8	Вінкристин	1,4(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
1	Доксорубіцин	35	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно
1-14	Преднізон	40	-	0	-	перорально
1-7	Прокарбазин	100	-	0	-	перорально
1	Циклофосфамід	1250	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно
1-3	Етопозид	200	0,9% NaCl	1000 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:



Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
2

Примітка:
Увага! Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній кількості доз ≥500 мг/м².
Якщо загальна доза становить ≥200 мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% NaCl.
(*) Вінкристин, макс. 2 мг.
Месна: 20% дози Циклофосфаміду, через 0, 4, 8 год. після прийому Циклофосфаміду (перорально або внутрішньовенно).
ГКСФ обовязкова на 8 добу до досягнення рівня лейкоцитів >1000/мм³ Продовження терапії лише через 48 годин після припинення ГКСФ.
Доза: 300 мкг/д підшкірно при масі тіла <75 кг; 450 мкг/кг при масі тіла >75 кг.
Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетна терапія» (17-е видання, Інсбрук).
Остання зміна змісту: січень 2016 р.
Література:
Diehl V. et al., N Engl J Med 348: 238ff, 2003.