

## Оксаліплатин / Іринотекан ХС672 (європейський протокол) Рак шлунку

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1,15	Іринотекан	125	0,9% NaCl	500 мл	30 минут	внутрішньовенно
1,15	Оксаліплатин	85	5% Глюкоза	500 мл	2 часа	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Іринотекан</b>																												
■														■														
<b>Оксаліплатин</b>																												
■														■														

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

**Увага! Іринотекан може викликати небезпечну для життя діарею та холінергічний синдром. Діарея може виникнути або в гострій формі або в деякі дні після введення Іринотекану.**

**Супутня медикація: Атропін 0,2 мг підшкірно або внутрішньовенно.**

**У разі діареї: Лоперамід, спочатку 4 мг, потім по 2 мг кожні 2 години. Прийом Лопераміді слід продовжувати ще протягом 12 годин після припинення діареї. Якщо вона триває більш ніж 48 годин або у разі лихоманки, рекомендується призначення Ципрофлоксацину та госпіталізація.**

#### Література:

**Wöll E. et al., Anticancer Res 28: 2901ff, 2008.**

