

## Базова ВЕАСОРР ХС144 (доба 1-3); ХА149 (доба 8) (європейський протокол) Ходжкінська лімфома

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м <sup>2</sup> | Розчинник | Об'єм (мл) | Час введення | Шлях введення   |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| 8           | Блеоміцин        | 10                           | -         | 0          | болус        | внутрішньовенно |
| 8           | Вінкрестин       | 1,4(*)                       | 0,9% NaCl | 100        | 10 хвилин    | внутрішньовенно |
| 1           | Доксорубіцин     | 25                           | 0,9% NaCl | 250        | 30 хвилин    | внутрішньовенно |
| 1-14        | Преднізон        | 40                           | -         | 0          | -            | перорально      |
| 1-7         | Прокарбазин      | 100                          | -         | 0          | -            | перорально      |
| 1           | Циклофосфамід    | 650                          | 0,9% NaCl | 500        | 1 година     | внутрішньовенно |
| 1-3         | Етопозид         | 100                          | 0,9% NaCl | 500        | 1 година     | внутрішньовенно |

### Графік введення препаратів:

| 1                    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| <b>Блеоміцин</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                      |   |   |   |   |   |   | ■ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Вінкрестин</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                      |   |   |   |   |   |   | ■ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Доксорубіцин</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Преднізон</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                    | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  |    |    |    |    |    |    |
| <b>Прокарбазин</b>   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                    | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Циклофосфамід</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>Етопозид</b>      |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| ■                    | ■ | ■ |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
21 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
2

#### Примітка:

Увага! Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній кількості доз  $\geq 500$  мг/м<sup>2</sup>.

Якщо загальна доза становить  $\geq 200$  мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% NaCl. (\*) Вінкрестин, макс. 2 мг.

Месна: 20% дози Циклофосфаміду, через 0, 4, 8 год. після прийому Циклофосфаміду (перорально або внутрішньовенно).

#### Література:

Diehl V. et al., Ann Oncol 8: 143ff, 1997.

