

## Базова ВЕАСОРР ХС144 (доба 1-3); ХА149 (доба 8) (європейський протокол) Ходжкінська лімфома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
8	Блеоміцин	10	-	0	болюс	внутрішньовенно
8	Вінкрестин	1,4(*)	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
1	Доксорубіцин	25	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1-14	Преднізон	40	-	0	-	перорально
1-7	Прокарбазин	100	-	0	-	перорально
1	Циклофосфамід	650	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно
1-3	Етопозид	100	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Блеоміцин</b>																				
							■													
<b>Вінкрестин</b>																				
							■													
<b>Доксорубіцин</b>																				
■																				
<b>Преднізон</b>																				
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
<b>Прокарбазин</b>																				
■	■	■	■	■	■	■														
<b>Циклофосфамід</b>																				
■																				
<b>Етопозид</b>																				
■	■	■																		

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
21 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
2

#### Примітка:

Увага! Доксорубіцин може бути кардіотоксичним при загальній кількості доз  $\geq 500$  мг/м<sup>2</sup>.

Якщо загальна доза становить  $\geq 200$  мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% NaCl. (\*) Вінкрестин, макс. 2 мг.

Месна: 20% дози Циклофосфаміду, через 0, 4, 8 год. після прийому Циклофосфаміду (перорально або внутрішньовенно).

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетная терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

Diehl V. et al., Ann Oncol 8: 143ff, 1997.

