

## СЕОР-ІМVP16-ДЕХА ХС236 (добу 1-5); ХС240 (добу 15-19); ХС244 (доба 22) (європейський протокол) НХЛ гостра

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1,8,10	Вінкрисдин	1,4(*)	0,9% NaCl	100	1 годину	внутрішньовенно
22	Метотрексат	800	0,9% NaCl	1000	-	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	750	0,9% NaCl	500	2 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Вінкрисдин</b>																												
█							█		█																			
<b>Метотрексат</b>																												
																						█						
<b>Циклофосфамід</b>																												
█																												

### Додаткова інформація

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
8**

#### Примітка:

**Месна: 150 мг/м<sup>2</sup> у 500 мл 0,9% розчину NaCl протягом 30 хвилин одразу до прийому Циклофосфаміду, потім 750 мг/м<sup>2</sup> протягом 12 год. (починаючи з прийому Циклофосфаміду).**

**(\*) Вінкрисдин, макс. 2 мг.**

**Увага! Епірубіцин може бути кардіотоксичним при загальній дозі  $\geq 1000$  мг/м<sup>2</sup>.**

**Кальцій фолінат: 15 мг/м<sup>2</sup> перорально кожні 6 год. на 23-25 добу.**

**Якщо загальна доза становить  $\geq 200$  мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% NaCl.**

#### Література:

**Fridrik MA., J Clin Oncol 14: 227ff, 1996.**

