

## СЕОР-IMVP16-DEXA ХС236 (добу 1-5); ХС240 (добу 15-19); ХС244 (доба 22) (європейський протокол) НХЛ гостра

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1,8,10	Вінкрисин	1,4(*)	0,9% NaCl	100 мл	1 годину	внутрішньовенно
22	Метотрексат	800	0,9% NaCl	1000 мл	-	внутрішньовенно
1	Циклофосфамід	750	0,9% NaCl	500 мл	2 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Вінкрисин</b>																												
█							█		█																			
<b>Метотрексат</b>																												
																						█						
<b>Циклофосфамід</b>																												
█																												

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
8

#### Примітка:

**Месна:** 150 мг/м<sup>2</sup> у 500 мл 0,9% розчину NaCl протягом 30 хвилин одразу до прийому Циклофосфаміду, потім 750 мг/м<sup>2</sup> протягом 12 год. (починаючи з прийому Циклофосфаміду).

(\*) Вінкрисин, макс. 2 мг.

**Увага!** Епірубіцин може бути кардіотоксичним при загальній дозі  $\geq 1000$  мг/м<sup>2</sup>.

**Кальцій фолінат:** 15 мг/м<sup>2</sup> перорально кожні 6 год. на 23-25 добу.

Якщо загальна доза становить  $\geq 200$  мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% NaCl.

#### Література:

Fridrik MA., J Clin Oncol 14: 227ff, 1996.

