

Цисплатин / Гемцитабін (локальний протокол) Рак легень

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8	Гемцитабін	1250	0,9% NaCl	250 мл	30 хвилин	внутрішньовенно
1	Цисплатин	75	0,9% NaCl	1000 мл	2 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Гемцитабін																					
■							■														
Цисплатин																					
■																					

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO₄ внутрішньовенно протягом 60 хв.
200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Перший цикл гемцитабіну слід припинити раніше у разі негематологічної токсичності ≥ 2 ступеня або ≥ 3 ступеня гематологічної токсичності;

Паспортна частина: нозологія - рак легені; код за мкх-10 - с 33, с 34.

Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

Література:

Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.

