

## Цисплатин / Доцетаксел (локальний протокол) Рак легень

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Доцетаксел	75	0,9% NaCl	250 мл	1 година	внутрішньовенно
1	Цисплатин	80	0,9% NaCl	1000 мл	2 години	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>Доцетаксел</b>																					
<b>Цисплатин</b>																					

### Додаткова інформація

**Примітка:**

**Цисплатин (лише якщо ШКФ  $\geq 60$  мл/хв):**

**Супутня медикація:**

**Премедикація:** 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.  
200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

**Постмедикація:** 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

**Доцетаксел розводять до 0,3-0,74 мг/мл.**

**Супутня медикація:** Дексаметазон 8 мг орально 2х щодоби протягом 3 діб, починаючи за один день до прийому Доцетакселу.

**Паспортна частина:** нозологія - рак легені; код за мкх-10 - с 33, с 34.

**Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.**

**Авторство:** [Національний інститут раку](#)

**Література:**

**Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.**

ПОВТОРНО НА:  
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

