

Цисплатин / Паклітаксел (локальний протокол) Рак легень

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м ² | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|-------------|------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 | Паклітаксел | 175 | 0,9% NaCl | 500 мл | 3 години | внутрішньовенно |
| 1 | Цисплатин | 80 | 0,9% NaCl | 1000 мл | 2 години | внутрішньовенно |

Графік введення препаратів:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Паклітаксел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цисплатин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO₄ внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Паклітаксел розводять до 0,3-1,2 мг/мл.

Супутня медикація до Паклітакселю:

Премедикація: Дексаметазон, 20 мг внутрішньовенно за 30 хвилин до Паклітакселю або Дексаметазону - 20 мг орально за 12 та за 6 годин до Паклітакселю.

Рекомендована додаткова премедикація 50 мг Ранітидину та 30 мг Дифенгідраміну.

Розведені розчини Паклітакселю вводять через інфузійні системи без ПВХ.

Паспортна частина: нозологія - рак легені; код за мкх-10 - с 33, с 34.

Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

Література:

Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.

