ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Цисплатин / Пеметрексед (локальний протокол) Рак легень

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Пеметрексед	500	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно
1	Цисплатин	75	0,9% NaCl	1000 мл	2 години	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Пеметрексед																						
Цисплатин																						

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:
За 1-3 тижні до початку терапії Пеметрекседом:
• Заміщення із застосуванням 350 – 1000 мкг фолієвої кислоти перорально щодоби до 3 тижнів після завершення терапії.
• Заміщення вітаміном B12: 1000 мкг в/м (один раз на 9 тижнів) до 3 тижнів після завершення терапії.
• Оральний прийом Дексаметазону – 8 мг перорально щодоби протягом 3 діб, починаючи за 1 день до початку прийому Пеметрекседу.
Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥60 мл/хв):
Супутня медикація:
Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв $MgSO_4$ внутрішньовенно протягом 60 хв.
200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.
Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.
Паспортна частина: нозологія – рак легені; код за мкх-10 – с 33, с 34.
Потенційні користувачі – відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інститутуту раку.
Авторство: Національний інститут раку
Література:
Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.