

Цисплатин / Етопозид (локальний протокол) Рак легень

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8	Цисплатин	50	0,9% NaCl	1000 мл	2 години	внутрішньовенно
1-5	Етопозид	50	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Цисплатин																												
Етопозид																												

Додаткова інформація

Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO₄ внутрішньовенно протягом 60 хв.
200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Якщо загальна доза становить ≥ 200 мг, Етопозид розчиняють у 1000 мл 0,9% NaCl.

Паспортна частина: нозологія - рак легені; код за МКХ-10 - с 33, с 34.

Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

Література:

Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

