

Мелфалан / Преднізон / Бортезоміб ХА020 (європейський протокол) Множинна мієлома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32	Бортезоміб	1,3	-	0	болюс	внутрішньовенно
1-4	Мелфалан	9	-	0	-	перорально
1-4	Преднізон	60	-	0	-	перорально

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Бортезоміб																																	
■			■					■													■			■									
Мелфалан																																	
■	■	■	■																														
Преднізон																																	
■	■	■	■																														

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
43 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
9

Примітка:

Починаючи з 5-го циклу та у всіх наступних циклах Бортезоміб вводять лише у дозах 1, 8, 22, 29. Бортезоміб також можна вводити підшкірно (концентрація: 2,5 мг/мл).

Автори: [Thomas Kühr](#), [Ewald Wöll](#), [Josef Thaler](#) (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетная терапія» (17-е видання, Інсбрук).

Остання зміна змісту: січень 2016 р.

Література:

San Miguel J.F. et al., N Engl J Med 359: 906ff, 2008;
Moreau P. et al., Lancet Oncol 12: 431ff, 2011.

