ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Мелфалан / Преднізон / Бортезоміб XA020 (європейський протокол) Множинна мієлома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 4, 8, 11, 22, 25, 29, 32	Бортезоміб	1,3	-	0	болюс	внутрішньовенно
1-4	Мелфалан	9	-	0	-	перорально
1-4	Преднізон	60	-	0	-	перорально

Графік введення препаратів:



Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
43 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
9

Примітка:
Починаючи з 5-го циклу та у всіх наступних циклах Бортезоміб вводять лише у дозах 1, 8, 22, 29. Бортезоміб також можна вводити підшкірно (концентрація: 2,5 мг/мл).
Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетная терапія» (17-е видання, Інсбрук).
Остання зміна змісту: січень 2016 р.
Література:
San Miguel J.F. et al., N Engl J Med 359: 906ff, 2008; Moreau P. et al., Lancet Oncol 12: 431ff, 2011.