ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Бевацизумаб (локальний протокол) Рак легень

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Бевацизумаб	15 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Бевацизумаб																												

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:
(*) Бевацизумаб: Початкову дозу вводять протягом 90 хвилин. У разі гарної переносимості першої інфузії, другу інфузію вводять протягом 60 хв. У разі гарної переносимості 60-хвилинної інфузії, всі наступні інфузії можна вводити протягом 30 хвилин.
Відповідно до ЕМА Бевацизумаб, як доповнення до хіміотерапії препаратами платини, був затверджений у дозі 7,5 мг/кг або 15 мг/кг.
Паспортна частина: нозологія – рак легені; код за мкх-10 – с 33, с 34.
Потенційні користувачі – відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інститутуту раку.
Авторство: Національний інститут раку
Література:
Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.