

## Пеметрексед / Бевацизумаб (локальний протокол) Рак легень

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Бевацизумаб	15 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 хвилин	внутрішньовенно
1	Пеметрексед	500	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Бевацизумаб</b>																												
<b>Пеметрексед</b>																												

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

#### Примітка:

За 1-3 тижні до початку терапії пеметрекседом:

- Заміщення з використанням 350-1000 мкг фолієвої кислоти перорально щодоби до 3-х тижнів після завершення терапії.
- Заміщення вітаміном В12: 1000 мкг в/м (раз в 9 тижнів) до 3 тижнів після завершення терапії.
- Оральний прийом дексаметазону - 8 мг перорально кожні добу протягом 3 днів, починаючи за 1 день до початку пеметрекседом.

(\*) Бевацизумаб: Початкову дозу вводять протягом 90 хвилин. У разі хорошої переносимості першої інфузії, другу інфузію вводять протягом 60 хвилин. У разі хорошої переносимості 60-хвилинної інфузії, всі наступні інфузії можна вводити протягом 30 хвилин.

Відповідно до ЕМА, Бевацизумаб, як додаток до хіміотерапії препаратами платини, був затверджений в дозі 7,5 мг / кг або 15 мг / кг.

Паспортна частина: нозологія - рак легені; код по МКБ -10 - з 33, з 34.

Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

Література:

Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.

