ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Пеметрексед / Бевацизумаб (локальний протокол) Рак легень

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Бевацизумаб	15 мг/кг	0,9% NaCl	100 мл	90 хвилин	внутрішньовенно
1	Пеметрексед	500	0,9% NaCl	100 мл	10 хвилин	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Бевацизумаб																													
Пеметрексед																													

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6

Примітка:
За 1-3 тижні до початку терапії пеметрекседом:
• Заміщення з використанням 350-1000 мкг фолієвої кислоти перорально щодоби до 3-х тижнів після завершення терапії.
• Заміщення вітаміном В12: 1000 мкг в/м (раз в 9 тижнів) до 3 тижнів після завершення терапії.
• Оральний прийом дексаметазону – 8 мг перорально кожні добу протягом 3 діб, починаючи за 1 день до початку пеметрекседом.
(*) Бевацизумаб: Початкову дозу вводять протягом 90 хвилин. У разі хорошої переносимості першої інфузії, другу інфузію вводять протягом 60 хвилин. У разі хорошої переносимості 60-хвилинної інфузії, всі наступні інфузії можна вводити протягом 30 хвилин.
Відповідно до ЕМА, Бевацизумаб, як додаток до хіміотерапії препаратами платини, був затверджений в дозі 7,5 мг / кг або 15 мг / кг.
Паспортна частина: нозологія – рак легені; код по МКБ -10 - з 33, з 34.
Потенційні користувачі – відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.
Авторство: Національний інститут раку
Література:
Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.