

## Гемцитабін (локальний протокол) Рак легень

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1, 8, 15	Гемцитабін	1000	0,9% NaCl	250	30 хвилин	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Гемцитабін																												
■							■							■														

### Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:  
29 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6

**Повторно:** \* Перший цикл слід припинити раніше у разі негематологічної токсичності  $\geq 2$  ступеня або  $\geq 3$  ступеня гематологічної токсичності; потім на 1, 8 та 15 добу, з повтором на 29 добу.

**Повторно:** через 28 доби.

**Примітка:**

**Паспортна частина:** нозологія - рак легені; код за мкх-10 - с 33, с 34.

**Потенційні користувачі -** відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.

**Література:**

**Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут** хворих на рак легені.

