ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

# Бортезоміб / Талідомід / Дексаметазон XA020 (європейський протокол) Множинна мієлома

| Дні терапії | Лікарський засіб | Дозування, мг/м$^2$ | Розчинник | Об'єм (мл / шт) | Час введення | Шлях введення |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 4, 8, 11 | Бортезоміб | 1,3 | - | 0 | - | підшкірно |
| 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12 | Дексаметазон | 40 (const) | - | 0 | - | перорально |
| 1-21 | Талідомід | 100 мг (const) | - | 0 | - | перорально |

**Графік введення препаратів:**




**Додаткова інформація**

ПОВТОРНО НА:
**22 (день)**

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
**3**

**Повторно: Доба 22 (*) - тривалий прийом.**
**Кількість циклів: 3.**
**Примітка:**
**(**) 100 мг талідоміду щодоби протягом перших 14 днів, потім по 200 мг Талідоміду щодоби.**
**Рекомендована профілактика утворення тромбів.**
**Концентрація Бортезомібу - 2,5 мг/мл.**
**Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетная терапія» (17-е видання, Інсбрук).**
**Остання зміна змісту: січень 2016 р.**
**Література:**
**Cavo M. et al., Lancet 376: 2075ff, 2010.**