ХЕМОТЕКА
ЦЕНТР ПЕРСОНАЛІЗОВАНОЇ ФАРМАЦІЇ

0800 402 022
050 440 90 62
office@chemoteka.com.ua

вул. Чигиринська, 21/11
Черкаси, 18030, Україна
chemoteka.com

Бортезоміб / Талідомід / Дексаметазон XA020 (європейський протокол) Множинна мієлома

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м^2	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 4, 8, 11	Бортезоміб	1,3	-	0	-	підшкірно
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12	Дексаметазон	40 (const)	-	0	-	перорально
1-21	Талідомід	100 мг (const)	-	0	-	перорально

Графік введення препаратів:



Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
22 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
3

Повторно: Доба 22 (*) - тривалий прийом.
Кількість циклів: 3.
Примітка:
(**) 100 мг талідоміду щодоби протягом перших 14 днів, потім по 200 мг Талідоміду щодоби.
Рекомендована профілактика утворення тромбів.
Концентрація Бортезомібу - 2,5 мг/мл.
Автори: Thomas Kühr, Ewald Wöll, Josef Thaler (керівництво «Протоколи хіміотерапії 2016. Поточні протоколи і таргетная терапія» (17-е видання, Інсбрук).
Остання зміна змісту: січень 2016 р.
Література:
Cavo M. et al., Lancet 376: 2075ff, 2010.