

Цисплатин / Іринотекан (локальний протокол) Дрібноклітинний рак легень - ДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8	Іринотекан	65	0,9% NaCl	250 мл	90 хвилин	внутрішньовенно
1, 8	Цисплатин	30	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Іринотекан																												
Цисплатин																												

Додаткова інформація

Примітка:

Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):

Супутня медикація:

Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO₄ внутрішньовенно протягом 60 хв.

200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.

Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.

Увага! Іринотекан може викликати небезпечну для життя діарею та холінергічний синдром. Діарея може виникнути або в гострій формі або в деякі дні після введення Іринотекану.

Супутня медикація: Атропін 0,2 мг підшкірно або внутрішньовенно

У разі діареї: Лоперамід, спочатку 4 мг, потім по 2 мг кожні 2 години. Прийом Лопераміду слід продовжувати ще протягом 12 годин після припинення діареї. Якщо вона триває більш ніж 48 годин або у разі лихоманки, рекомендується призначення Ципрофлоксацину та госпіталізація.

Паспортна частина: нозологія - рак легені; код за мкх-10 - с 33, с 34.

Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.

Авторство: [Національний інститут раку](#)

Література:

Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.

**ПОВТОРНО НА:
29 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6**

