

## Цисплатин / Іринотекан (локальний протокол) Дрібноклітинний рак легень - ДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м <sup>2</sup>	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1, 8	Іринотекан	65	0,9% NaCl	250 мл	90 хвилин	внутрішньовенно
1, 8	Цисплатин	30	0,9% NaCl	500 мл	1 година	внутрішньовенно

### Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>Іринотекан</b>																												
<b>Цисплатин</b>																												

### Додаткова інформація

**Примітка:**

**Цисплатин (лише якщо ШКФ  $\geq 60$  мл/хв):**

**Супутня медикація:**

**Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO<sub>4</sub> внутрішньовенно протягом 60 хв.**

**200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.**

**Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.**

**Увага! Іринотекан може викликати небезпечну для життя діарею та холінергічний синдром. Діарея може виникнути або в гострій формі або в деякі дні після введення Іринотекану.**

**Супутня медикація: Атропін 0,2 мг підшкірно або внутрішньовенно**

**У разі діареї: Лоперамід, спочатку 4 мг, потім по 2 мг кожні 2 години. Прийом Лопераміду слід продовжувати ще протягом 12 годин після припинення діареї. Якщо вона триває більш ніж 48 годин або у разі лихоманки, рекомендується призначення Ципрофлоксацину та госпіталізація.**

**Паспортна частина: нозологія - рак легені; код за мкх-10 - с 33, с 34.**

**Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.**

**Авторство: [Національний інститут раку](#)**

**Література:**

**Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.**

**ПОВТОРНО НА:  
29 (день)**

**КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:  
6**

