

Цисплатин / Іринотекан (локальний протокол) Дрібноклітинний рак легень - ДРЛ

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл)	Час введення	Шлях введення
1, 8	Іринотекан	65	0,9% NaCl	250	90 хвилин	внутрішньовенно
1, 8	Цисплатин	30	0,9% NaCl	500	1 година	внутрішньовенно

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Іринотекан																												
Цисплатин																												

Додаткова інформація

Примітка:**Цисплатин (лише якщо ШКФ ≥ 60 мл/хв):****Супутня медикація:****Премедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl + 10 мЕкв KCl + 8 мЕкв MgSO₄ внутрішньовенно протягом 60 хв.****200 мл 20% розчину Манніту протягом 30 хв.****Постмедикація: 500 мл 0,9% розчину NaCl внутрішньовенно + 10 мЕкв KCl.****Увага! Іринотекан може викликати небезпечну для життя діарею та холінергічний синдром. Діарея може виникнути або в гострій формі або в деякі дні після введення Іринотекану.****Супутня медикація: Атропін 0,2 мг підшкірно або внутрішньовенно****У разі діареї: Лоперамід, спочатку 4 мг, потім по 2 мг кожні 2 години. Прийом Лоперамиду слід продовжувати ще протягом 12 годин після припинення діареї. Якщо вона триває більш ніж 48 годин або у разі лихоманки, рекомендується призначення Ципрофлоксацину та госпіталізація.****Паспортна частина: нозологія - рак легені; код за мкх-10 - с 33, с 34.****Потенційні користувачі - відділення пухлин органів грудної порожнини Національного інституту раку.****Література:****Локальний протокол медичної допомоги та клінічний маршрут хворих на рак легені.****ПОВТОРНО НА:
29 (день)****КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
6**